

**Рекомендованные объемы добычи (вылова) водных
биоресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается,
и районы их добычи (вылова) на 2020 г.**

(в тоннах, морские млекопитающие в штуках)

Таблица 1

Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн

Чукотское море

| | | |
|-----------------------------|-----|----------|
| Сайка | | 3895,860 |
| Кольчатая нерпа (акиба) | шт. | 541 |
| Морской заяц (лахтак) | шт. | 1404 |
| Полосатый тюлень (крылатка) | шт. | 180 |
| Обыкновенный тюлень (ларга) | шт. | 478 |

Чукотская зона Берингова моря

| | | |
|-----------------------------|-----|--------|
| Сайка | | 509,50 |
| Бычки | | 250,00 |
| Сельдь тихоокеанская | | 136,98 |
| Кольчатая нерпа (акиба) | шт. | 845 |
| Морской заяц (лахтак) | шт. | 709 |
| Полосатый тюлень (крылатка) | шт. | 788 |
| Обыкновенный тюлень (ларга) | шт. | 417 |

Западно - Берингоморская зона

| | | |
|-------------------------|--|----------|
| Навага | | 4980,30 |
| Сайка | | 1189,50 |
| Камбалы дальневосточные | | 21680,95 |
| Бычки | | 23390,50 |
| Скаты | | 2192,50 |
| Мойва | | 3399,20 |
| Угольная рыба | | 134,30 |

| | | |
|-----------------------------|-----|-----------|
| Сельдь тихоокеанская | | 77961,995 |
| Палтус стрелозубый | | 1516,50 |
| Краб-стригун ангулятус | | 169,70 |
| Креветка северная | | 1319,50 |
| Креветка углохвостая | | 729,30 |
| Шримсы-медвежата | | 24,00 |
| Шримсы козырьковые | | 34,00 |
| Кальмар командорский | | 24998,70 |
| Трубачи | | 99,50 |
| Кольчатая нерпа (акиба) | шт. | 135 |
| Морской заяц (лахтак) | шт. | 248 |
| Полосатый тюлень (крылатка) | шт. | 1999 |
| Обыкновенный тюлень (ларга) | шт. | 1118 |

Восточно-Камчатская зона, Карагинская подзона

| | | |
|----------------------|--|----------|
| Бычки | | 1438,00 |
| Скаты | | 155,00 |
| Угольная рыба | | 17,80 |
| Корюшка малоротая | | 89,77 |
| Кальмар командорский | | 14498,70 |
| Ламинарии | | 995,00 |

Восточно-Камчатская зона, Петропавловско - Командорская подзона

| | | |
|-----------------------|--|----------|
| Бычки | | 2989,500 |
| Скаты | | 375,100 |
| Угольная рыба | | 22,210 |
| Сельдь тихоокеанская | | 62,500 |
| Мидии | | 49,000 |
| Морской еж зеленый | | 3,750 |
| Морской еж многоиглый | | 34,000 |
| Ламинарии | | 954,850 |

Северо - Курильская зона

| | |
|-----------------------|----------|
| Сайра * | 10995,40 |
| Бычки | 9696,00 |
| Скаты | 797,00 |
| Палтус стрелозубый | 88,00 |
| Кальмар тихоокеанский | 750,00 |
| Ламинарии | 2640,00 |

* - допустимо перераспределение объёмов рекомендованного вылова сайры между Южно-Курильской и Северо-Курильской зонами без превышения суммарной величины рекомендованного вылова

Южно - Курильская зона

| | |
|---------------------------|-----------|
| Скумбрия | 214961,50 |
| Анчоусы | 4429,78 |
| Сайра* | 63124,79 |
| Бычки | 335,00 |
| Лемонема | 12000,00 |
| Тунцы | 99,92 |
| Скаты | 438,52 |
| Акулы | 197,37 |
| Сардина иваси | 234945,00 |
| Корифена | 20,00 |
| Палтус стрелозубый | 199,70 |
| Корюшка малоротая морская | 123,10 |
| Лещ морской японский | 199,56 |
| Гипероглиф | 65,00 |
| Кальмар Бартрама | 29999,65 |
| Кальмар тихоокеанский | 10501,25 |
| Осьминог песчаный | 75,90 |
| Спизула | 400,00 |
| Анфельция | 9000,00 |
| Алария | 11068,00 |
| Костария ребристая | 9800,00 |

Ламинарии 86700,00

* - допустимо перераспределение объёмов рекомендованного вылова сайры между Южно-Курильской и Северо-Курильской зонами без превышения суммарной величины рекомендованного вылова

Охотское море

Северо-Охотоморская подзона

| | | |
|-----------------------------|-----|---------|
| Треска | | 974,92 |
| Навага | | 488,894 |
| Окунь морской | | 39,60 |
| Бычки | | 46,80 |
| Скаты | | 1293,50 |
| Мойва | | 3051,80 |
| Ликоды | | 899,30 |
| Креветка гренландская | | 11,70 |
| Креветка углохвостая | | 626,94 |
| Шримсы-медвежата | | 228,95 |
| Шримсы козырьковые | | 194,00 |
| Перонидия | | 3,91 |
| Мия | | 13,85 |
| Силиква | | 1,94 |
| Морской еж зеленый | | 199,70 |
| Ламинарии | | 399,40 |
| Кольчатая нерпа (акиба) | шт. | 775 |
| Морской заяц (лахтак) | шт. | 107 |
| Полосатый тюлень (крылатка) | шт. | 194 |
| Обыкновенный тюлень (ларга) | шт. | 589 |

Западно -Камчатская подзона

| | | |
|---------------------------|--|---------|
| Бычки * | | 978,90 |
| Скаты* | | 594,50 |
| Мойва * | | 4566,50 |
| Ликоды * | | 299,00 |
| Корюшка малоротая морская | | 137,10 |

| | | |
|-----------------------------|--|-------|
| Креветка гренландская | | 1,50 |
| Шримсы-медвежата | | 60,00 |
| Шримсы козырьковые | | 3,00 |
| Ламинарии | | 95,00 |
| Морской заяц (лахтак) | | 137 |
| Полосатый тюлень (крылатка) | | 91 |

* – допустимо перераспределение объёмов рекомендованного вылова бычков, мойвы, скатов и ликодов между Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонами без превышения суммарной величины рекомендованного вылова каждого вида

Камчатско - Курильская подзона

| | | |
|-----------------------------|-----|---------|
| Бычки * | | 2964,00 |
| Скаты* | | 1157,50 |
| Ликоды * | | 998,00 |
| Ламинарии | | 95,00 |
| Морской заяц (лахтак) | шт. | 2500 |
| Обыкновенный тюлень (ларга) | шт. | 62 |

* – допустимо перераспределение объёмов рекомендованного вылова бычков, мойвы, скатов и ликодов между Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонами без превышения суммарной величины рекомендованного вылова каждого вида

Восточно- Сахалинская подзона

| | | |
|----------------------------------|--|---------|
| Бычки | | 1877,70 |
| Скаты | | 291,30 |
| Песчанки | | 1000,00 |
| Мойва | | 4459,30 |
| Ликоды | | 299,70 |
| Сельдь тихоокеанская | | 3769,80 |
| Красноперки-угаи дальневосточные | | 856,20 |
| Корюшка малоротая морская | | 901,40 |
| Корюшка малоротая | | 155,70 |
| Креветка гренландская | | 167,00 |
| Устрицы | | 0,83 |
| Петушок | | 10,30 |

| | | |
|-----------------------------|-----|----------|
| Спизула | | 524,00 |
| Анфельция | | 899,90 |
| Ламинарии | | 18499,50 |
| Кольчатая нерпа (акиба) | шт. | 400 |
| Морской заяц (лахтак) | шт. | 100 |
| Полосатый тюлень (крылатка) | шт. | 100 |
| Обыкновенный тюлень (ларга) | шт. | 400 |

Японское море

Западно-Сахалинская подзона

| | | |
|----------------------------------|--|----------|
| Анчоусы | | 1999,98 |
| Навага | | 1196,00 |
| Бычки | | 1067,00 |
| Скаты | | 353,00 |
| Мойва | | 7671,00 |
| Сардина иваси | | 6999,46 |
| Красноперки-угаи дальневосточные | | 283,20 |
| Рыба-лапша | | 20,70 |
| Кефали | | 164,70 |
| Корюшка малоротая морская | | 234,20 |
| Корюшка малоротая | | 82,10 |
| Креветка углохвостая | | 1100,00 |
| Кальмар командорский * | | 1500,00 |
| Кальмар тихоокеанский | | 14999,70 |
| Осьминог Дофлейна гигантский | | 130,00 |
| Осьминог песчаный | | 60,00 |
| Ламинарии | | 4799,50 |

* – кальмар командорский подзоны Приморье и Западно-Сахалинской подзоны – допустимо перераспределение объёмов между подзонами зоны Японское море без превышения суммарной величины рекомендованного вылова кальмара командорского зоны Японское море.

подзона Приморье

| | | |
|---------|--|----------|
| Анчоусы | | 4748,080 |
|---------|--|----------|

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Навага | 3560,985 |
| Камбалы дальневосточные | 10037,693 |
| Сайра | 7749,850 |
| Бычки | 7923,026 |
| Терпуги | 1716,630 |
| Скаты | 997,500 |
| Мойва | 4887,088 |
| Сардина иваси | 2949,150 |
| Красноперки-угаи дальневосточные | 1569,024 |
| Рыба-собака | 372,190 |
| Рыба-лапша | 75,000 |
| Кефали | 987,994 |
| Корюшка малоротая морская | 730,055 |
| Корюшка малоротая | 1685,240 |
| Мизиды | 35,990 |
| Кальмар командорский * | 7500,000 |
| Кальмар тихоокеанский | 34893,800 |
| Осьминог Дофлейна гигантский | 97,400 |
| Осьминог песчаный | 165,730 |
| Мидии | 1244,625 |
| Устрицы | 987,810 |
| Петушок | 0,900 |
| Мерценария Стимпсона | 694,900 |
| Мактра | 90,400 |
| Мия | 4,900 |
| Сердцевидка | 1,870 |
| Каллиста | 41,870 |
| Каллитака | 0,950 |
| Серрипес | 201,930 |
| Глицимерис | 53,900 |
| Плоские ежи | 24,150 |
| Морской еж палевый | 0,500 |
| Асцидии | 19,860 |
| Медузы | 1999,810 |
| Анфельция | 999,000 |
| Зостера | 2999,200 |

* – кальмар командорский подзоны Приморье и Западно-Сахалинской подзоны – допустимо перераспределение объёмов между подзонами зоны Японское море без превышения суммарной величины рекомендованного вылова кальмара командорского зоны Японское море

Таблица 2

Азово-Черноморский рыбохозяйственный бассейн

Азовское море

(включая Таганрогский залив, Керченский пролив, Таманский и Динской заливы, зал. Сиваш, нижнее течение рек Дон, Кубань, р. Протока, азовские лиманы Краснодарского края, включая лиманы Ейский, Бейсугский, Ахтарский)

| | |
|--|-----------|
| Сельдь черноморско-азовская (проходная)* | 507,121 |
| Тарань | 462,270 |
| Тюлька | 47986,800 |
| Хамса** | 16587,800 |
| Камбала-калкан | 1,735 |
| Акулы | 20,000 |
| Скаты | 14,700 |
| Ставрида | 221,898 |
| Пиленгас | 503,435 |
| Кефали | 219,840 |
| Лещ | 62,455 |
| Рыбец (сырть) | 9,500 |
| Прочие морские*** | 89,105 |
| Прочие пресноводные**** | 466,64 |
| Атерина | 598,645 |
| Перкарина | 99,650 |
| Сарган | 1,830 |
| Карась | 2944,670 |
| Бычки***** | 15095,180 |
| Креветки черноморские | 99,380 |
| Артемии (на стадии цист) | 87,765 |
| Артемии | 144,860 |
| Рапана | 2499,420 |

Хирономиды*****

1244,500

* – освоение рекомендованного объёма сельди черноморско-азовской проходной и барабули осуществляется в Азовском и Чёрном морях;

** – освоение хамсы в Азовском море осуществляется с учётом объёмов добычи (вылова) хамсы в Чёрном море к востоку от меридиана, проходящего через мыс Сарыч;

*** – Азовское море: камбала-гlossa, карась морской, луфарь, пузанок азовский, смарида;

**** – амур белый, берш, густера, краснопёрка, жерех, окунь пресноводный, сазан, сом пресноводный, толстолобики, уклея (уклея), щука, подуст, линь, язь, ёрш пресноводный, верховка;

***** – объём добычи (вылова) бычков в Азовском море 15,1 тыс. т, в том числе:

- в прибрежной пятикилометровой зоне Азовского моря, в Таганрогском заливе и Керченском проливе, включая Таманский и Динской заливы - 7 тыс. т; - за пределами прибрежной пятикилометровой зоны в Азовском море - 8,1 тыс. т;

***** – объём добычи (вылова) в зал. Сиваш

Черное море

| | |
|-----------------------|-----------|
| Тюлька | 100,000 |
| Хамса* | 6990,290 |
| Шпрот (килька) | 23543,850 |
| Камбала-калкан** | 370,700 |
| Мерланг | 1492,348 |
| Барабуля*** | 1925,177 |
| Акулы | 145,567 |
| Скаты | 356,155 |
| Ставрида | 6313,215 |
| Пиленгас | 3,400 |
| Кефали | 489,265 |
| Прочие морские**** | 158,200 |
| Атерина | 137,600 |
| Луфарь | 169,770 |
| Пеламида | 9,998 |
| Скумбрия | 2,000 |
| Смарида | 266,350 |
| Сарган | 37,760 |
| Креветки черноморские | 242,846 |
| Мидии***** | 409,370 |
| Рапана | 269,400 |

*– освоение хамсы в Чёрном море осуществляется к западу от меридиана, проходящего через мыс Сарыч;

** – рекомендованный объем: в Чёрном море западнее меридиана 36°35'00" в.д. – 0,329 тыс.т; в том числе в целях промышленного рыболовства – 0,327591 тыс. т; в Черном море восточнее меридиана 36°35'00" в.д. – 0,044 тыс. т, в том числе в целях промышленного рыболовства – 0,043111 тыс. т;

*** – освоение рекомендованного объема сельди черноморско-азовской проходной и барабули осуществляется в Азовском и Чёрном морях;

**** - бычки, горбыль тёмный, камбала-глосса, карась морской, налим средиземноморский, пузанок азовский, скорпена;

***** - добыча (вылов) мидии осуществляется в пределах исключительной экономической зоны России

Волжско – Каспийский рыбохозяйственный бассейн

Каспийское море

| | |
|----------------------|-----------|
| Сельдь долгинская | 5991,820 |
| Пузанок каспийский | 4997,070 |
| Пузанок большеглазый | 2599,040 |
| Килька анчоусовидная | 19093,200 |
| Килька большеглазая | 129,040 |
| Килька обыкновенная | 79959,100 |
| Кефали | 2495,800 |
| Чехонь | 129,800 |
| Линь | 650,740 |
| Рыбец (сырть) | 271,290 |
| Атерина | 6998,450 |
| Карась | 7313,030 |
| Бычки | 499,230 |
| Жерех | 795,420 |
| Красноперка | 8835,390 |
| Окунь пресноводный | 1816,540 |
| Густера | 1447,080 |
| Синец | 37,120 |
| Толстолобики | 348,200 |
| Амур белый | 148,800 |

Таблица 4

Северный рыбохозяйственный бассейн

Баренцево море

| | | |
|--------------------------------------|-----|-----------|
| Сельдь чешско-печорская* | | 1679,400 |
| Навага* | | 490,480 |
| Сайка | | 9965,980 |
| Камбала речная* | | 0,400 |
| Камбала полярная* | | 110,290 |
| Камбала морская | | 6995,800 |
| Камбала лиманда (ершоватка северная) | | 752,900 |
| Камбала-ерш | | 1738,000 |
| Пинагор | | 674,800 |
| Акулы | | 1100,000 |
| Зубатка синяя | | 2982,500 |
| Зубатки | | 4375,500 |
| Скаты | | 3900,000 |
| Менек | | 1000,000 |
| Сайда | | 2289,400 |
| Язь | | 1,970 |
| Чир | | 0,500 |
| Пелядь | | 0,500 |
| Омуль арктический | | 0,300 |
| Песчанки | | 599,595 |
| Корюшка азиатская зубастая* | | 19,190 |
| Ряпушка | | 0,500 |
| Налим | | 0,500 |
| Щука | | 4,950 |
| Окунь пресноводный | | 0,450 |
| Плотва | | 1,000 |
| Креветка северная | | 39974,990 |
| Шримсы-медвежата | | 10,000 |
| Мидии | | 1949,785 |
| Модиолус | | 1000,000 |
| Трубачи | | 24,400 |
| Морской еж зеленый | | 5999,485 |
| Кукумария | | 999,600 |
| Ламинарии | | 17498,400 |
| Фукусы | | 2498,500 |
| Морской заяц (лахтак) | шт. | 117 |

| | | |
|-------------------------|-----|-----|
| Кольчатая нерпа (акиба) | шт. | 467 |
|-------------------------|-----|-----|

* – включая вылов в устьях рек;

Белое море

| | | |
|--------------------------------------|-----|----------|
| Сельдь беломорская | | 2379,48 |
| Сельдь чешско-печорская* | | 43,60 |
| Треска** | | 94,95 |
| Навага* | | 2095,00 |
| Камбала речная* | | 9,65 |
| Камбала полярная* | | 39,82 |
| Камбала лиманда (ершоватка северная) | | 24,60 |
| Пинагор | | 224,50 |
| Сиг | | 0,90 |
| Язь | | 1,47 |
| Елец | | 0,07 |
| Корюшка азиатская зубастая* | | 35,40 |
| Щука | | 0,47 |
| Ерш пресноводный | | 0,20 |
| Окунь пресноводный | | 0,47 |
| Плотва | | 0,27 |
| Лещ | | 0,97 |
| Судак | | 0,07 |
| Кумжа (форель) | | 0,10 |
| Мидии | | 1350,00 |
| Морские гребешки | | 104,50 |
| Кукумария | | 84,90 |
| Ламинарии | | 59198,80 |
| Фукусы | | 13698,20 |
| Кольчатая нерпа (акиба) | шт. | 462 |
| Гренландский тюлень | шт. | 14022 |

* – включая вылов в устьях рек;

** – в Белом море южнее 67°20' северной широты

Таблица 5

Западный рыбохозяйственный бассейн

Балтийское море
(за исключением Куршского, Калининградского (Вислинского) и
Финского заливов)

| | |
|-----------------|-------|
| Камбала морская | 15,00 |
| Судак | 45,00 |
| Камбала-тюрко | 24,58 |

заливы Балтийского моря

Куршский залив

| | |
|--------------------------------|--------|
| Сиг | 1,97 |
| Корюшка европейская * | 399,99 |
| Рыбец (сырть) | 50,00 |
| Налим | 29,98 |
| Щука | 49,94 |
| Ерш пресноводный | 119,90 |
| Окунь пресноводный | 199,97 |
| Корюшка европейская, (снеток)* | 99,80 |
| Колюшка трехиглая | 9,98 |
| Угорь речной | 1,98 |
| Атлантическая финта | 60,00 |

* – включая реки бассейна Куршского залива;

Калининградский (Вислинский) залив

| | |
|--------------------|-------|
| Налим | 4,99 |
| Щука | 4,95 |
| Ерш пресноводный | 0,95 |
| Окунь пресноводный | 69,90 |
| Угорь речной | 19,98 |

Финский залив

| | |
|----------------------|--------|
| Сиг | 15,00 |
| Корюшка европейская* | 639,99 |

| | |
|--------------------|--------|
| Ряпушка | 35,00 |
| Миноги* | 50,00 |
| Рыбец (сырть) | 8,00 |
| Налим | 9,99 |
| Щука | 14,95 |
| Ерш пресноводный | 399,95 |
| Окунь пресноводный | 114,95 |
| Плотва | 169,98 |
| Лещ | 189,98 |
| Колюшка трехиглая | 40,00 |
| Чехонь | 11,99 |

* - включая реки, впадающие в Финский залив;

Таблица 6

Западно - Сибирский рыбохозяйственный бассейн

Карское море

| | |
|----------------------------|----------|
| Гольцы | 0,100 |
| Сайка | 1987,850 |
| Омуль арктический | 2,410 |
| Муксун | 0,050 |
| Корюшка азиатская зубастая | 1,460 |
| Камбала полярная | 9,660 |
| Навага | 97,230 |
| Сельдь чёшско-печорская | 411,000 |
| Кольчатая нерпа (акиба) | 470 |
| Морской заяц (лахтак) | 129 |

губы Карского моря:

Обская губа

| | |
|----------------------------|----------|
| Сайка | 10,000 |
| Ряпушка | 789,995 |
| Омуль арктический | 29,995 |
| Муксун | 0,070 |
| Нельма | 0,050 |
| Пелядь | 10,000 |
| Сиг | 19,995 |
| Чир | 2,500 |
| Корюшка азиатская зубастая | 199,465 |
| Налим | 742,150 |
| Лещ | 1,995 |
| Щука | 11,197 |
| Язь | 1,995 |
| Плотва | 2,000 |
| Окунь пресноводный | 2,000 |
| Елец | 0,980 |
| Ерш пресноводный | 699,567 |
| Бычки | 1,850 |
| Камбала полярная | 10,000 |
| Навага | 1098,990 |
| Сельдь чёшско-печорская | 5,000 |
| Мойва | 1,000 |
| Хариус | 0,020 |

Тазовская губа

| | |
|----------------------------|---------|
| Ряпушка | 41,645 |
| Пелядь | 169,600 |
| Сиг | 237,415 |
| Чир | 59,420 |
| Корюшка азиатская зубастая | 9,810 |
| Налим | 54,700 |
| Лещ | 2,995 |
| Щука | 109,195 |
| Язь | 27,995 |
| Плотва | 1,995 |
| Окунь пресноводный | 1,995 |
| Елец | 0,997 |
| Ерш пресноводный | 49,677 |

Гыданская губа

| | |
|----------------------------|---------|
| Гольцы | 0,150 |
| Сайка | 0,950 |
| Ряпушка | 79,695 |
| Омуль арктический | 39,395 |
| Пелядь | 4,800 |
| Сиг | 29,425 |
| Чир | 1,430 |
| Корюшка азиатская зубастая | 19,815 |
| Налим | 0,050 |
| Щука | 3,998 |
| Плотва | 1,000 |
| Окунь пресноводный | 1,000 |
| Ерш пресноводный | 1,427 |
| Бычки | 0,900 |
| Навага | 224,490 |

Байдарацкая губа

| | |
|--------|---------|
| Гольцы | 0,300 |
| Сайка | 309,800 |

| | |
|----------------------------|---------|
| Ряпушка | 6,695 |
| Омуль арктический | 2,495 |
| Муксун | 0,005 |
| Пелядь | 2,950 |
| Сиг | 4,895 |
| Чир | 0,750 |
| Корюшка азиатская зубастая | 14,845 |
| Налим | 1,000 |
| Щука | 2,500 |
| Ерш пресноводный | 1,447 |
| Бычки | 175,980 |
| Камбала полярная | 269,700 |
| Навага | 246,490 |
| Сельдь чёшско-печорская | 84,500 |
| Мойва | 3,000 |

Юрацкая губа

| | |
|----------------------------|--------|
| Сайка | 0,995 |
| Ряпушка | 0,995 |
| Омуль арктический | 0,990 |
| Пелядь | 1,000 |
| Сиг | 0,995 |
| Чир | 0,995 |
| Корюшка азиатская зубастая | 4,995 |
| Щука | 1,400 |
| Бычки | 0,990 |
| Навага | 14,995 |

заливы Карского моря:

Енисейский залив

| | |
|-------|-------|
| Налим | 4,900 |
|-------|-------|

Пясинский залив

| | |
|-------|-------|
| Налим | 4,900 |
|-------|-------|

Хатангский залив моря Лаптевых

| | |
|----------------------------|-------|
| Ряпушка | 0,255 |
| Муксун | 3,218 |
| Нельма | 0,100 |
| Сиг | 0,760 |
| Чир | 0,720 |
| Корюшка азиатская зубастая | 0,150 |
| Налим | 3,660 |
| Щука | 0,100 |
| Кольчатая нерпа (акиба) | 478 |

Таблица 7

Восточно-Сибирский рыбохозяйственный бассейн

Восточно - Сибирское море

| | |
|-----------------------------|------|
| Кольчатая нерпа (акиба) | 2250 |
| Полосатый тюлень (крылатка) | 20 |
| Обыкновенный тюлень (ларга) | 200 |
| Морской заяц (лахтак) | 150 |

